

## 商品名 ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL 医薬品基本情報

薬効	7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）	一般名	ガドブトロールキット
英名	Gadovist	剤型	キット類
薬価	7953.00	規格	60.47% 10mL 1筒
メーカー	バイエル薬品	毒劇区分	

### ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mLの効能・効果

磁気共鳴コンピューター断層撮影の(躯幹部・四肢造影、脳・脊髄造影)

### ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mLの使用制限等

1. 類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 一般状態の極度に悪い、気管支喘息、重篤な腎障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	原則禁止
3. eGFRが30mL/min/1.73m <sup>2</sup> 未満の慢性腎障害、長期透析が行われている終末期腎障害、急性腎障害<重篤な腎障害を除く>	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	希望禁止
4. 腎機能低下<重篤な腎障害を除く>又はその恐れ・疑い、腎障害<重篤な腎障害を除く>	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
5. 重篤な腎障害	記載場所	重大な副作用
	注意レベル	注意
6. 腎機能低下又はその恐れ・疑い、重篤な腎障害、腎障害、アレルギーを起こし易い体質、アレルギー性鼻炎を起こし易い体質、発疹を起こし易い体質、じん麻疹を起こし易い体質、アレルギーの家族歴、アレルギー性鼻炎の家族歴、気管支喘息の家族歴、発疹の家族歴、じん麻疹の家族歴、薬物過敏症の既往、痙攣を起こし易い体質、てんかんを起こし易い体質、痙攣又はその既往、てんかん又はその既往	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

### ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mLの副作用等

<p>1. ショック、アナフィラキシー、血圧低下、呼吸困難、意識消失、咽頭浮腫、喉頭浮腫、顔面浮腫、呼吸停止、心停止、痙攣発作、腎性全身性線維症、Nephrogenic Systemic Fibrosis、NSF、皮膚そう痒、皮膚腫脹、皮膚硬化、関節硬直、筋力低下、急性呼吸窮迫症候群、肺水腫、急速に進行する呼吸困難、低酸素血症、両側性びまん性肺浸潤影、胸部X線異常</p>	<p>記載場所 重大な副作用</p>
	<p>頻度 頻度不明</p>
<p>2. 過敏症、血管浮腫、紅斑、そう痒感、めまい、結膜炎、味覚異常、錯感覚、嗅覚錯誤、蒼白、チアノーゼ、動悸、気管支痙攣、咳嗽、くしゃみ、呼吸困難、多汗症、胸痛、倦怠感、冷感</p>	<p>記載場所 その他の副作用</p>
	<p>頻度 頻度不明</p>
<p>3. 発疹、潮紅、じん麻疹、頭痛、嘔気、嘔吐、口内乾燥、血圧上昇、頻脈、熱感、注射部位反応</p>	<p>記載場所 その他の副作用</p>
	<p>頻度 5%未満</p>
<p>4. 重篤な副作用、腎性全身性線維症、ショック、アナフィラキシー、遅発性副作用、発熱、発疹、悪心、血圧低下、呼吸困難、胎仔骨変異、流産、早産、血管痛、静脈炎、発赤、腫脹、水疱、疼痛</p>	<p>記載場所 使用上の注意</p>
	<p>頻度 頻度不明</p>
<p>5. 味覚異常、熱感、嘔吐</p>	<p>記載場所 使用上の注意</p>
	<p>頻度 5%未満</p>

