

商品名 ストロカイン錠5mg 添付文書情報

一般名	オキセサゼイン錠	薬価	6.00
規格	5mg 1錠	区分	
製造メーカー	アルフレッサ ファーマ	販売メーカー	アルフレッサ ファーマ エーザイ
薬効	1. 神経系及び感覚器官用医薬品 12. 末梢神経系用薬 121. 局所麻酔剤 1219. その他の局所麻酔剤		

ストロカイン錠5mgの用法・用量

オキセサゼインとして、通常成人1日15～40mgを3～4回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

ストロカイン錠5mgの効能・効果

次記疾患に伴う疼痛・酸症状・あい気・悪心・嘔吐・胃部不快感・便意ひっ迫：食道炎、胃炎、胃潰瘍・十二指腸潰瘍、過敏性大腸症（イリタブルコロン）。

ストロカイン錠5mgの副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：

- [1] 過敏症：（頻度不明）発疹。
- [2] 消化器：（0.1～5%未満）便秘、食欲不振、口渇、悪心、下痢。
- [3] 精神神経系：（0.1～5%未満）頭痛、眩暈、（頻度不明）眠気、脱力感。

ストロカイン錠5mgの使用上の注意

【禁忌】

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者。

【重要な基本的注意】

1. 長期連続投与は避けること。

【妊婦】

治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

【授乳婦】

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

【小児等】

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

【高齢者】

減量するなど注意すること（一般に生理機能が低下している）。

【適用上の注意】

1. 薬剤交付時の注意：

- 1) 口内にしびれ等を残さないため噛み砕いたりせずに、速やかに飲みくださいよう注意させること。
- 2) PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること（PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜に刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある）。

【取扱い上の注意】

アルミ袋開封後、湿気を避けて保存すること（湿気により含量が低下する）。

【保管上の注意】

室温保存。

