

商品名 アフロクアロン錠20mg「トーワ」 添付文書情報

一般名	アフロクアロン20mg錠	薬価	5.90
規格	20mg 1錠	区分	
製造メーカー	東和薬品	販売メーカー	東和薬品
薬効	1. 神経系及び感覚器官用医薬品 12. 末梢神経系用薬 124. 鎮けい剤 1249. その他の鎮けい剤		

アフロクアロン錠20mg「トーワ」の用法・用量

アフロクアロンとして、通常成人1日量60mg（3錠）を3回に分けて経口投与する。年齢、症状により適宜増減する。

アフロクアロン錠20mg「トーワ」の効能・効果

- [1] 次記疾患における筋緊張状態の改善：頸肩腕症候群、腰痛症。
- [2] 次記疾患による痙性麻痺：脳血管障害、脳性麻痺、痙性脊髄麻痺、脊髄血管障害、頸部脊椎症、後縦靱帯骨化症、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、外傷後遺症（脊髄損傷後遺症、頭部外傷後遺症）、術後後遺症（脳腫瘍術後後遺症・脊髄腫瘍術後後遺症を含む）、その他の脳脊髄疾患。

アフロクアロン錠20mg「トーワ」の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められる場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：

- [1] 精神神経系：（0.1～5%未満）ふらつき、めまい、眠気、（0.1%未満）頭痛。
- [2] 消化器：（0.1～5%未満）悪心、食欲不振、腹痛、胃部不快感、（0.1%未満）嘔吐、下痢、口渇、便秘、腹部膨満感、胃炎。
- [3] 皮膚：（0.1%未満）光線過敏症。
- [4] 過敏症：（0.1～5%未満）発疹、そう痒。
- [5] その他：（0.1～5%未満）脱力感、倦怠感、（0.1%未満）浮腫、耳鳴、頻尿、口内炎。

使用成績調査を含む。

アフロクアロン錠20mg「トーフ」の使用上の注意

【禁忌】

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者。

【重要な基本的注意】

反射運動能力の低下、眠気等が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

【授乳婦】

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

【小児等】

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

【高齢者】

減量するなど注意すること（一般に高齢者では生理機能が低下している）。

【適用上の注意】

1. 薬剤交付時の注意：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること（PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある）。

【取扱い上の注意】

外箱開封後は光を避けて保存すること。

【保管上の注意】

室温保存。



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』