

## 商品名 オキシブプロカイン塩酸塩ミニムス点眼液0.4%「センジュ」 添付文書情報

|        |                                                               |        |              |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 一般名    | オキシブプロカイン塩酸塩点眼液                                               | 薬価     | 0.00         |
| 規格     | 0.4% 0.5mL 1個                                                 | 区分     |              |
| 製造メーカー | 千寿製薬                                                          | 販売メーカー | 千寿製薬<br>武田薬品 |
| 薬効     | 1. 神経系及び感覚器官用医薬品<br>13. 感覚器官用薬<br>131. 眼科用剤<br>1313. 眼科用局所麻酔剤 |        |              |

### オキシブプロカイン塩酸塩ミニムス点眼液0.4%「センジュ」の用法・用量

通常成人では1～4滴を点眼する。なお、年齢、体質により適宜増減する。

### オキシブプロカイン塩酸塩ミニムス点眼液0.4%「センジュ」の効能・効果

眼科領域における表面麻酔。

#### 【効能又は効果に関連する注意】

鎮痛のみの目的に使用しないこと。

### オキシブプロカイン塩酸塩ミニムス点眼液0.4%「センジュ」の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

- 重大な副作用：
  - ショック、アナフィラキシー（いずれも頻度不明）：悪心、顔面蒼白、紅斑、発疹、呼吸困難、血圧低下、眼瞼浮腫等の症状が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- その他の副作用：
  - 過敏症：（頻度不明）過敏症状。
  - 眼：（頻度不明）角膜びらん。

### オキシブプロカイン塩酸塩ミニムス点眼液0.4%「センジュ」の使用上の注意

## 【禁忌】

1. 本剤の成分又は安息香酸エステル（コカインを除く）系局所麻酔剤に対し過敏症の既往歴のある患者。

## 【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、使用上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

## 【授乳婦】

使用上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

## 【小児等】

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

## 【高齢者】

一般に生理機能が低下している。

## 【適用上の注意】

1. 薬剤投与前の注意：本剤を酸化エチレン＜EO＞ガスで滅菌すると、有効成分の含量が低下し、白濁することがあるため、EOガス滅菌しないこと。
2. 薬剤投与時の注意：
  - 1) 使用の際は、開栓時の容器破片除去のため最初の2～3滴は捨てること。
  - 2) 角膜障害等の副作用をおこすことがあるので、頻回に使用しないこと。
  - 3) 他の点眼剤を併用する場合には、少なくとも5分以上間隔をあけてから点眼すること。
  - 4) 鎮痛等を目的とした使用を防止するため、患者には渡さないこと。
  - 5) シングルユースタイプの製剤で、保存剤を含有しないので、必ず1本で1回の使用に限定し、使用後の容器は廃棄すること。

## 【保険給付上の注意】

本剤は保険給付の対象とならない（薬価基準未収載）。

（オキシブプロカイン塩酸塩ミニムス点眼液0.4%「センジュ」の使用法）

- ①. 薬液が入っていない部分を持ち、添付文書の図の↑印のところをねじ切る。
- ②. 使用する前に2～3滴捨てる。

・ 1本で1回の使用に限定し、使用後の容器は薬液が残っていても必ず捨てる。

## 【保管上の注意】

室温保存。



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.