

商品名 ケトチフェン点眼液0.05%「TYK」 添付文書情報

一般名	ケトチフェンフマル酸塩3.45mg5mL点眼液	薬価	129.50
規格	3.45mg 5mL 1瓶	区分	
製造メーカー	武田テバ薬品	販売メーカー	武田テバ薬品 武田テバファーマ 武田薬品
薬効	1. 神経系及び感覚器官用医薬品 13. 感覚器官用薬 131. 眼科用剤 1319. その他の眼科用剤		

ケトチフェン点眼液0.05%「TYK」の用法・用量

通常1回1～2滴を1日4回（朝、昼、夕方及び就寝前）点眼する。

ケトチフェン点眼液0.05%「TYK」の効能・効果

アレルギー性結膜炎。

ケトチフェン点眼液0.05%「TYK」の副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

副作用が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行う。

1. 過敏症：（頻度不明）眼瞼炎、眼瞼皮膚炎、そう痒感、発疹、眼部腫脹、眼瞼浮腫、顔面浮腫。
2. 眼：（頻度不明）結膜充血、眼刺激感、角膜糜爛、眼痛、霧視、眼乾燥、結膜炎、羞明。
3. その他：（頻度不明）眠気、頭痛、口渇。

ケトチフェン点眼液0.05%「TYK」の使用上の注意

【禁忌】

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者。

【妊婦・産婦・授乳婦等への投与】

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与する〔妊娠中の投

与に関する安全性は確立していない】。

【適用上の注意】

1. 投与経路：点眼用にのみ使用する。
2. 投与时：
 - 1) 点眼した時に液が眼瞼皮膚等についた場合は、すぐにふき取るよう指導する。
 - 2) 薬液汚染防止のため、点眼のとき、容器の先端が直接目に触れないように注意するよう指導する。
 - 3) ベンザルコニウム塩化物によりソフトコンタクトレンズを変色させることがあるので、ソフトコンタクトレンズを装着している場合は、点眼前にレンズを外し、点眼15分以上経過後に再装用する。

【取扱い上の注意】

安定性試験：最終包装製品を用いた加速試験（40℃、相対湿度75%、6カ月）の結果、本剤は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.