

商品名 ケトチフェン点眼液0.05%「CH」 添付文書情報

一般名	ケトチフェンフマル酸塩液	薬価	158.80
規格	3.45mg 5mL 1瓶	区分	
製造メーカー	長生堂製薬	販売メーカー	長生堂製薬 日本ジェネリック
薬効	1. 神経系及び感覚器官用医薬品 13. 感覚器官用薬 131. 眼科用剤 1319. その他の眼科用剤		

ケトチフェン点眼液0.05%「CH」の用法・用量

通常1回1～2滴を1日4回（朝、昼、夕方及び就寝前）点眼する。

ケトチフェン点眼液0.05%「CH」の効能・効果

アレルギー性結膜炎。

ケトチフェン点眼液0.05%「CH」の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：

- [1] 過敏症：（0.1%～5%未満）眼瞼炎、眼瞼皮膚炎、そう痒感、（頻度不明）発疹、眼部腫脹、眼瞼浮腫、顔面浮腫。
- [2] 眼：（0.1%～5%未満）結膜充血、眼刺激感、（0.1%未満）角膜びらん、（頻度不明）眼痛、霧視、眼乾燥、結膜炎、羞明。
- [3] その他：（0.1%～5%未満）眠気、（頻度不明）頭痛、口渇。

発現頻度は使用成績調査を含む。

ケトチフェン点眼液0.05%「CH」の使用上の注意

【禁忌】

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者。

【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

【適用上の注意】

1. 薬剤交付時の注意：患者に対し次の点に注意するよう指導すること。
 - ・ 薬液汚染防止のため、点眼のとき、容器の先端が直接目に触れないように注意すること。
 - ・ 患眼を開瞼して結膜嚢内に点眼し、1～5分間閉瞼して涙嚢部を圧迫させた後、開瞼すること。
 - ・ 他の点眼剤を併用する場合には、少なくとも5分以上間隔をあけてから点眼すること。
 - ・ ベンザルコニウム塩化物によりソフトコンタクトレンズを変色させることがあるので、ソフトコンタクトレンズを装用している場合は、点眼前にレンズを外し、点眼15分以上経過後に再装用すること。

【保管上の注意】

室温保存。



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.