

商品名 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」 添付文書情報

一般名	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル	薬価	7.50
規格	200mg 1カプセル	区分	
製造メーカー	日医工ファーマ	販売メーカー	日医工ファーマ 日医工
薬効	2. 個々の器官系用医薬品 21. 循環器官用薬 219. その他の循環器官用薬 2190. その他の循環器官用薬		

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」の用法・用量

通常成人には、1日3カプセルを3回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。なお、トコフェロールニコチン酸エステルとしての用法及び用量は、通常成人1日300～600mgを3回に分けて経口投与する。

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」の効能・効果

- [1] 次記に伴う随伴症状：高血圧症。
- [2] 高脂質血症。
- [3] 次記に伴う末梢循環障害：閉塞性動脈硬化症。

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：

- [1] 消化器：（0.1～5%未満）食欲不振、胃部不快感、胃痛、悪心、下痢、便秘。
- [2] 過敏症：（0.1%未満）発疹。
- [3] 肝臓：（0.1%未満）肝機能障害（AST上昇、ALT上昇等）。
- [4] その他：（0.1%未満）温感、潮紅、（頻度不明）顔面浮腫、浮腫。

発現頻度は副作用発生頻度調査結果に基づく。

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」の使用上の注意

【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

【授乳婦】

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

【小児等】

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

【適用上の注意】

1. 薬剤交付時の注意：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること（PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜に刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある）。

【取扱い上の注意】

アルミビロー包装開封後は、高温、湿気を避けて保存すること。

【保管上の注意】

室温保存。



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』