

商品名 セネガシロップ 添付文書情報

一般名	セネガシロップ	薬価	17.90
規格	10mL	区分	
製造メーカー	山善製薬	販売メーカー	山善製薬
薬効	2. 個々の器官系用医薬品 22. 呼吸器官用薬 223. 去たん剤 2231. 植物性製剤		

セネガシロップの用法・用量

セネガシロップとして、通常成人1日10～35mLを3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

セネガシロップの効能・効果

次記疾患に伴う喀痰喀出困難：急性気管支炎、感冒・上気道炎。

セネガシロップの副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：消化器：（頻度不明）嘔気、嘔吐、下痢、食欲不振〔大量投与によりあらわれることがある〕。

セネガシロップの使用上の注意

【禁忌】

ジスルフィラム投与中、シアナミド投与中、カルモフル投与中、プロカルバジン塩酸塩投与中の患者。

【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

【授乳婦】

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

【相互作用】

1. 併用禁忌：ジスルフィラム＜ノックピン＞、シアナミド＜シアナマイド＞、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩〔これらの薬剤とのアルコール反応（顔面潮紅、血圧降下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等）を起こすおそれがある（本剤はエタノールを含有しているため）〕。
2. 併用注意：N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質（セフメノキシム塩酸塩、セフォペラゾンナトリウム、セフミノクスナトリウム水和物、セフメタゾールナトリウム、ラタモキシセフナトリウム）、メトロニダゾール〔これらの薬剤とのアルコール反応＜顔面潮紅・悪心・頻脈・多汗・頭痛等＞を起こすおそれがある（本剤はエタノールを含有しているため）〕。

【取扱い上の注意】

本剤は原料に天然物が含まれているため、その産地や採集時期により、製品の色調やにおいが一定しないことがある。

【保管上の注意】

室温保存。



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.