

商品名 クロモグリク酸Na吸入液1%「アメル」 添付文書情報

一般名	クロモグリク酸ナトリウム1%2mL吸入液	薬価	27.20
規格	1% 2mL 1管	区分	
製造メーカー	共和薬品	販売メーカー	共和薬品
薬効	2. 個々の器官系用医薬品 22. 呼吸器官用薬 225. 気管支拡張剤 2259. その他の気管支拡張剤		

クロモグリク酸Na吸入液1%「アメル」の用法・用量

朝、昼および就寝前ないしは朝、昼、夕および就寝前1回1アンプル宛、1日3～4アンプルを電動式ネブライザーを用いて吸入する。症状の緩解が得られれば、その後の経過を観察しながら1日2～3アンプルに減量すること。

クロモグリク酸Na吸入液1%「アメル」の効能・効果

気管支喘息。

クロモグリク酸Na吸入液1%「アメル」の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

1. 重大な副作用：

- 1) 気管支痙攣（0.1%未満）：吸入中又は直後に、重篤な気管支痙攣があらわれることがある。
- 2) PIE症候群（0.1%未満）：PIE症候群（好酸球増多を伴う肺浸潤；発熱、咳嗽、喀痰を伴うことが多い）があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、必要であればステロイド剤等を投与すること。
- 3) アナフィラキシー（0.1%未満）：アナフィラキシー（呼吸困難、血管浮腫、じん麻疹等）があらわれることがある。

2. その他の副作用：

- [1] 過敏症：（0.1～5%未満）発疹。
- [2] 咽喉頭：（0.1～5%未満）咽喉頭刺激感。
- [3] その他：（0.1～5%未満）悪心。

クロモグリク酸Na吸入液1%「アメル」の使用上の注意

【禁忌】

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者。

【重要な基本的注意】

1. 本剤は既に起こっている喘息発作を抑える薬剤ではないので、発作発現時は対症療法が必要であることを患者又は保護者に十分説明しておくこと。
2. 本剤の使用により、ステロイド維持量を減量し得た患者で本剤吸入療法を中止する場合は原疾患再発のおそれがあるので、減量前のステロイド維持量に戻すこと。

【合併症・既往歴等のある患者】

1. 長期ステロイド療法を受けている患者：本剤吸入によりステロイドの減量をはかる場合は十分な管理下で徐々に行うこと。

【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること（動物実験（ウサギ、マウス）で母体に毒性があらわれる大量の注射により胎仔毒性（胎仔吸収、胎仔体重減少等）の報告がある）。

【適用上の注意】

1. 薬剤交付時の注意：本剤は電動式ネブライザーを用いて吸入させ、患者又は保護者に本剤の吸入法をよく指導し、習熟させる（本剤を内服しても効果はみられない）。
2. 薬剤投与時の注意：
 - 1) 吸入時には新しいアンプル1本を使用し、既に開管したアンプルの残液は使用しないこと。また、吸入後ネブライザー内に残った液は捨てること。
 - 2) ブロムヘキシシン塩酸塩との配合で白濁を生じるため、配合は避けること。

【取扱い上の注意】

外箱開封後は遮光して保存すること。

【保管上の注意】

室温保存。



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』