

商品名 ポビドンヨードガーグル液7%「シオエ」 添付文書情報

一般名	ポビドンヨード含嗽剤	薬価	3.70
規格	7% 1mL	区分	
製造メーカー	シオエ製薬	販売メーカー	シオエ製薬 日本新薬
薬効	2. 個々の器官系用医薬品 22. 呼吸器官用薬 226. 含嗽剤 2260. 含嗽剤		

ポビドンヨードガーグル液7%「シオエ」の用法・用量

用時15～30倍（2～4mLを約60mLの水）に希釈し、1日数回含嗽する。

ポビドンヨードガーグル液7%「シオエ」の効能・効果

咽頭炎、扁桃炎、口内炎、拔牙創を含む口腔創傷の感染予防、口腔内の消毒。

ポビドンヨードガーグル液7%「シオエ」の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

1. 重大な副作用：
 - 1) ショック（0.1%未満）、アナフィラキシー（0.1%未満）：呼吸困難、不快感、浮腫、潮紅、蕁麻疹等があらわれることがある。
2. その他の副作用：
 - [1] 過敏症：（0.1%未満）発疹。
 - [2] 口腔：（0.1～5%未満）口腔刺激感、咽頭刺激感、（0.1%未満）口腔粘膜びらん、口中のあれ。
 - [3] 消化器：（0.1～5%未満）悪心。
 - [4] その他：（0.1%未満）不快感。

ポビドンヨードガーグル液7%「シオエ」の使用上の注意

【禁忌】

本剤に対し過敏症又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある患者。

【合併症・既往歴等のある患者】

1. 甲状腺機能異常のある患者：血中ヨウ素の調節ができず甲状腺ホルモン関連物質に影響を与えるおそれがある。

【適用上の注意】


1. 薬剤使用時の注意：
 - 1) 用時希釈し、希釈後は早めに使用すること。
 - 2) 抜歯後等の口腔創傷の場合、血餅の形成が阻害されと考えられる時期には、はげしい洗口を避けること。
 - 3) 眼に入らないように注意する（入った場合には、水でよく洗い流す）。

【取扱い上の注意】

外箱開封後は、直射日光を避けて保存すること。

【保管上の注意】

室温保存。



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.