

商品名 ジメチコン内用液2%「FSK」 添付文書情報

一般名	ジメチコンシロップ	薬価	3.00
規格	2% 1mL	区分	
製造メーカー	伏見製薬所	販売メーカー	伏見製薬所
薬効	2. 個々の器官系用医薬品 23. 消化器官用薬 231. 止しゃ剤, 整腸剤 2318. ジメチコン製剤		

ジメチコン内用液2%「FSK」の用法・用量

〈胃腸管内のガスに起因する腹部症状の改善に使用する場合〉

ジメチルポリシロキサンとして、通常成人1日120～240mgを食後又は食間の3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

〈胃内視鏡検査時における胃内有泡性粘液の除去に使用する場合〉

検査15～40分前にジメチルポリシロキサンとして、通常成人40～80mgを約10mLの水とともに経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

〈腹部X線検査時における腸内ガスの駆除に使用する場合〉

検査3～4日前よりジメチルポリシロキサンとして、通常成人1日120～240mgを食後又は食間の3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

ジメチコン内用液2%「FSK」の効能・効果

- [1] 胃腸管内のガスに起因する腹部症状の改善。
- [2] 胃内視鏡検査時における胃内有泡性粘液の除去。
- [3] 腹部X線検査時における腸内ガスの駆除。

ジメチコン内用液2%「FSK」の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：

- [1] 消化器：（0.1～5%未満）軟便、胃部不快感、下痢、腹痛、（0.1%未満）嘔吐、嘔気、食欲不振、胃部重圧感。
- [2] その他：（0.1%未満）頭痛。

発現頻度は、再評価結果を含む。

ジメチコン内用液2%「FSK」の使用上の注意

【適用上の注意】

1. 薬剤投与時の注意：振とう後使用すること。

【保管上の注意】

室温保存。



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.