

## 商品名 テプレノンカプセル50mg「サワイ」 添付文書情報

一般名	テプレノン50mgカプセル	薬価	6.50
規格	50mg 1カプセル	区分	
製造メーカー	沢井製薬	販売メーカー	沢井製薬
薬効	2. 個々の器官系用医薬品 23. 消化器官用薬 232. 消化性潰瘍用剤 2329. その他の消化性潰瘍用剤		

### テプレノンカプセル50mg「サワイ」の用法・用量

通常成人、3カプセル（テプレノンとして150mg）を1日3回に分けて食後に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

### テプレノンカプセル50mg「サワイ」の効能・効果

- [1] 次記疾患の胃粘膜病変（胃粘膜びらん、胃粘膜出血、胃粘膜発赤、胃粘膜浮腫）の改善：急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期。
- [2] 胃潰瘍。

### テプレノンカプセル50mg「サワイ」の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

1. 重大な副作用：
  - 1) 肝機能障害、黄疸（いずれも頻度不明）：AST上昇、ALT上昇、 $\gamma$ -GTP上昇、Al-P上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。
2. その他の副作用：
  - [1] 消化器：（0.1%未満）便秘、下痢、嘔気、口渇、腹痛、腹部膨満感。
  - [2] 肝臓：（0.1～5%未満）AST上昇、ALT上昇。
  - [3] 精神神経系：（0.1%未満）頭痛。
  - [4] 過敏症：（0.1%未満）発疹、そう痒感。
  - [5] その他：（0.1%未満）総コレステロール上昇、眼瞼発赤・眼瞼熱感、（頻度不明）血小板減少。

発現頻度は製造販売後調査を含む。

## テプレノンカプセル50mg「サワイ」の使用上の注意

### 【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること（妊娠中の投与を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない）。

### 【授乳婦】

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

### 【小児等】

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

### 【高齢者】

一般に、生理機能が低下していることが多い。

### 【適用上の注意】

2. 薬剤交付時の注意：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること（PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある）。

### 【保管上の注意】

室温保存。



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』