

商品名 トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「ツルハラ」 添付文書情報

一般名	トリメブチンマレイン酸塩細粒	薬価	13.70
規格	20% 1g	区分	
製造メーカー	鶴原製薬	販売メーカー	鶴原製薬
薬効	2. 個々の器官系用医薬品 23. 消化器官用薬 239. その他の消化器官用薬 2399. 他に分類されない消化器官用薬		

トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「ツルハラ」の用法・用量

- 慢性胃炎における消化器症状に使用する場合

トリメブチンマレイン酸塩として、通常成人1日量300mg（本剤1.5g）を3回に分けて経口投与する。年齢、症状により適宜増減する。

- 過敏性腸症候群に使用する場合

トリメブチンマレイン酸塩として、通常成人1日量300～600mg（本剤1.5g～3.0g）を3回に分けて経口投与する。

トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「ツルハラ」の効能・効果

- [1] 慢性胃炎における消化器症状（腹部膨満感、腹部疼痛、悪心、嘔気）。
- [2] 過敏性腸症候群。

トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「ツルハラ」の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

1. 重大な副作用：

- 1) 肝機能障害（0.1%未満）、黄疸（頻度不明）：AST上昇、ALT上昇、ALP上昇、LDH上昇、 γ -GTP上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。

2. その他の副作用：

- [1] 消化器：（0.1%未満）便秘、下痢、腹鳴、口渇、口内しびれ感、悪心、嘔吐。
- [2] 循環器：（0.1%未満）心悸亢進。
- [3] 精神神経系：（0.1%未満）眠気、めまい、倦怠感、頭痛。
- [4] 過敏症：（0.1%未満）発疹、蕁麻疹、そう痒感。
- [5] 泌尿器：（0.1%未満）排尿障害、尿閉。

発現頻度は、製造販売後調査の結果を含む。

トリメブチンマレイン酸塩細粒20%「ツルハラ」の使用上の注意

【授乳婦】

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること（非臨床試験で乳汁への移行が認められている）。

【小児等】

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

【高齢者】

減量するなど注意すること（一般に生理機能が低下している）。

【保管上の注意】

室温保存。



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.