

## 商品名 ポビドンヨード液10%消毒用アプリケータ「オーツカ」10mL 添付文書情報

|        |                                                            |        |                |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 一般名    | ポビドンヨード液                                                   | 薬価     | 10.90          |
| 規格     | 10% 10mL 1管                                                | 区分     |                |
| 製造メーカー | 大塚製薬工場                                                     | 販売メーカー | 大塚製薬工場<br>大塚製薬 |
| 薬効     | 2. 個々の器官系用医薬品<br>26. 外皮用薬<br>261. 外皮用殺菌消毒剤<br>2612. ヨウ素化合物 |        |                |

### ポビドンヨード液10%消毒用アプリケータ「オーツカ」10mLの用法・用量

〈手術部位（手術野）の皮膚の消毒、手術部位（手術野）の粘膜の消毒〉

本剤を塗布する。

〈皮膚・粘膜の創傷部位の消毒、熱傷皮膚面の消毒、感染皮膚面の消毒〉

本剤を患部に塗布する。

### ポビドンヨード液10%消毒用アプリケータ「オーツカ」10mLの効能・効果

手術部位（手術野）の皮膚の消毒、手術部位（手術野）の粘膜の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒、熱傷皮膚面の消毒、感染皮膚面の消毒。

### ポビドンヨード液10%消毒用アプリケータ「オーツカ」10mLの副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

#### 1. 重大な副作用：

- 1) ショック、アナフィラキシー（いずれも0.1%未満）：呼吸困難、不快感、浮腫、潮紅、蕁麻疹等があらわれることがある。

#### 2. その他の副作用：

- [1] 過敏症：（0.1%未満）発疹。
- [2] 皮膚：（0.1%未満）接触皮膚炎、皮膚そう痒感、皮膚灼熱感、皮膚潰瘍、皮膚変色。
- [3] 甲状腺：（0.1%未満）血中甲状腺ホルモン値上昇（T3値上昇、T4値上昇等）あるいは血中甲状腺ホルモン値低下（T3値低下、T4値低下等）などの甲状腺機能異常。

## ポビドンヨード液10%消毒用アプリケータ「オーツカ」10mLの使用上の注意

### 【禁忌】

本剤に対し過敏症又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある患者。

### 【合併症・既往歴等のある患者】

1. 甲状腺機能異常のある患者：血中ヨウ素の調節ができず甲状腺ホルモン関連物質に影響を与えるおそれがある。
2. 重症熱傷患者：ヨウ素の吸収により、血中ヨウ素値が上昇することがある。

### 【妊婦】

妊婦または妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。長期にわたる広範囲の使用を避けること。ポビドンヨード製剤を妊婦の腔内に長期間使用し、新生児に一過性甲状腺機能低下があらわれたとの報告がある。

### 【授乳婦】

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。長期にわたる広範囲の使用を避けること。ポビドンヨード製剤を腔内に使用し、乳汁中の総ヨウ素値が一過性に上昇したとの報告がある。

### 【小児等】

ポビドンヨード製剤を新生児に使用し、一過性甲状腺機能低下を起こしたとの報告がある。

### 【臨床検査結果に及ぼす影響】

酸化反応を利用した潜血試験において、本剤が検体に混入すると偽陽性を示すことがある。

### 【適用上の注意】

1. 薬剤使用時の注意：
  - 1) 使用に際しては、開封口からゆっくり開けること。
  - 2) 開封時及び開封後は、フォームに触れないこと。
  - 3) 薬液容器開通時は薬液がハンドル内からなくなるまでフォーム面を下にし、水平に保持すること。
  - 4) フォームに薬液を浸透させた後は速やかに使用すること。
  - 5) 大量かつ長時間の接触によって接触皮膚炎、皮膚変色があらわれることがあるので、溶液の状態で長時間皮膚と接触させない（本剤が手術時に体の下にたまった状態や、ガーゼ・シーツ等にしみ込み湿った状態で、長時間皮膚と接触しないよう消毒後は拭き取るか乾燥させるなど注意する）。
  - 6) 眼に入らないように注意する（入った場合には、水でよく洗い流す）。
  - 7) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い落としてから使用すること。
  - 8) 電気的な絶縁性をもっているので、電気メスを使用する場合には、本剤が対極板と皮膚の間に入らないよう注意すること。
  - 9) 開封後の使用は一回限りとし、使用後は速やかに廃棄すること。

### 【その他の注意】

1. 臨床使用に基づく情報：ポビドンヨード製剤を腔内に使用し、血中総ヨウ素値が一過性に上昇及び血中無機ヨウ素値が一過性に上昇したとの報告がある。

### 【取扱い上の注意】

1. ブリスター包装内は滅菌しているので、使用時まで開封しないこと。
2. 次の場合には使用しないこと。・ ブリスター包装内に薬液が漏れている場合には使用しないこと。・ 薬液容器を開通させる前にハンドル内もしくはフォームに薬液が漏れている場合には使用しないこと。

### 【操作方法】

1. ブリスター包装の開封口からシールをゆっくり剥がす。注意：ブリスター包装は使用直前まで開封しないこと。
2. スリーブの先端を押して薬液容器を開通させる。注意：スリーブからの液漏れ、フォームからの液垂れ防止のため、次を守る。・ 薬液がハンドル内からなくなるまでフォーム面を下にし、水平に保持すること。
3. 消毒部位に適量を塗布する。

### 【保管上の注意】

室温保存。



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』