

商品名 オキシドール恵美須 添付文書情報

一般名	オキシドール	薬価	8.00
規格	10mL	区分	
製造メーカー	恵美須薬品化工	販売メーカー	恵美須薬品化工
薬効	2. 個々の器官系用医薬品 26. 外皮用薬 261. 外皮用殺菌消毒剤 2614. 過酸化物製剤		

オキシドール恵美須の用法・用量

〈創傷・潰瘍〉

原液のままあるいは2～3倍希釈して塗布・洗浄する。

〈耳鼻咽喉〉

原液のまま塗布、滴下あるいは2～10倍（耳科の場合、時にグリセリン、アルコールで希釈する）希釈して洗浄、噴霧、含嗽に用いる。

〈口腔〉

口腔粘膜の消毒、齲窩及び根管の清掃・消毒、歯の清浄には原液又は2倍希釈して洗浄・拭掃する。口内炎の洗口には10倍希釈して洗口する。

オキシドール恵美須の効能・効果

- [1] 創傷・潰瘍の殺菌・消毒。
- [2] 外耳・中耳の炎症、鼻炎、咽喉頭炎、扁桃炎などの粘膜の炎症。
- [3] 口腔粘膜の消毒、齲窩及び根管の清掃・消毒、歯の清浄、口内炎の洗口。

オキシドール恵美須の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

1. 重大な副作用：

- 1) 空気塞栓（頻度不明）：循環動態異常を認めた場合など空気塞栓が疑われる症状がみられた場合は、速やかに本剤の使用を中止し、適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：口腔：（頻度不明）口腔粘膜刺激〔連用により発現することがある〕。

オキシドール恵美須の使用上の注意

【禁忌】

瘻孔、挫創等本剤を使用した際に体腔にしみ込むおそれのある部位には使用しないこと〔空気塞栓を起こしたとの報告がある〕。

【適用上の注意】

1. 薬剤使用時の注意：

- 1) 外用にのみ使用し、内服しないこと。
- 2) 眼に入らないように注意する（入った場合には水でよく洗い流す）。
- 3) 易刺激性の部位に使用する場合には、正常の部位に使用する場合よりも低濃度とすることが望ましい。
- 4) 深い創傷に使用する場合は希釈液としては注射用水か滅菌精製水を用い、水道水や精製水を用いないこと。
- 5) 長期間又は広範囲に使用しないこと。

【その他の注意】

2. 非臨床使用に基づく情報：長期大量経口投与によりマウスの十二指腸腫瘍の発生が認められたとの報告がある。

【取扱い上の注意】

本剤は光によって変化するので、遮光した容器に入れ密栓してなるべく冷所に保存すること。

【保管上の注意】

30℃以下。

