

## 商品名 ハンドコール 添付文書情報

一般名	ベンザルコニウム塩化物液	薬価	0.00
規格	0.2% 10mL	区分	
製造メーカー	日興製薬	販売メーカー	日興製薬 日興製薬販売
薬効	2. 個々の器官系用医薬品 26. 外皮用薬 261. 外皮用殺菌消毒剤 2616. 石鹼類製剤		

### ハンドコールの用法・用量

〈医療従事者の通常の手指消毒の場合〉

本剤約3mLを1回手掌にとり、乾燥するまで摩擦する。ただし、血清、膿汁等の有機物が付着している場合は、十分に洗い落した後、本剤による消毒を行う。

〈術前・術後の術者の手指消毒の場合〉

手指及び前腕部を石けんでよく洗浄し、水で石けん分を十分洗い落した後、本剤約3mLを手掌にとり、乾燥するまで摩擦し、更にこの本剤による消毒を2回繰り返す。

### ハンドコールの効能・効果

医療施設における医師、看護師等の医療従事者の手指消毒。

### ハンドコールの副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：

- [1] 過敏症：（頻度不明）紅斑、そう痒感、浮腫等。
- [2] 皮膚：（頻度不明）皮膚刺激症状。

### ハンドコールの使用上の注意

#### 【禁忌】

損傷皮膚及び粘膜には使用しないこと〔刺激作用を有する〕。

## 【適用上の注意】

### 1. 薬剤使用時の注意：

- 1) 手指消毒以外の目的には使用しないこと。
- 2) 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。
- 3) 眼に入らないよう注意する（入った場合には水でよく洗い流す）。
- 4) 反復使用した場合には脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 5) 血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は十分に洗い落としてから使用すること。
- 6) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、予備洗浄に用いた石けん分を十分に洗い落としてから使用すること。
- 7) 引火性があり、爆発の危険性もあるため、火気には十分注意すること。
- 8) 本剤で消毒した手指で2.5kg以下の低出生体重児を取扱う場合、低出生体重児の皮膚がかぶれることがあるので十分注意すること。

## 【取扱い上の注意】

火気を避けて保存すること。

## 【保険給付上の注意】

本剤は保険給付の対象とならない（薬価基準未収載）。

## 【保管上の注意】

室温保存。

