

商品名 消毒用グルコジンハンドリキッド0.2% 添付文書情報

一般名	クロルヘキシジングルコン酸塩液	薬価	0.00
規格	0.2% 10mL	区分	
製造メーカー	ヤクハン製薬	販売メーカー	ヤクハン製薬 日医工
薬効	2. 個々の器官系用医薬品 26. 外皮用薬 261. 外皮用殺菌消毒剤 2619. その他の外皮用殺菌消毒剤		

消毒用グルコジンハンドリキッド0.2%の用法・用量

本剤をそのまま用いる。

消毒用グルコジンハンドリキッド0.2%の効能・効果

手指の消毒。

消毒用グルコジンハンドリキッド0.2%の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

1. 重大な副作用：
 - 1) ショック（0.1%未満）、アナフィラキシー（頻度不明）：血圧低下、じん麻疹、呼吸困難等があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。
2. その他の副作用：
 - [1] 過敏症：（0.1%未満）発疹、じん麻疹。
 - [2] 皮膚：（頻度不明）皮膚刺激症状。

消毒用グルコジンハンドリキッド0.2%の使用上の注意

【禁忌】

1. クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある者。
2. 腔、膀胱、口腔等の粘膜面には使用しないこと〔クロルヘキシジン製剤の前記部位への使用により、ショック、アナフィラキシーの症状の発現が報告されている〕。

3. 損傷皮膚及び粘膜には使用しないこと〔刺激作用を有する〕。

【重要な基本的注意】

ショック、アナフィラキシー等の反応を予測するため、使用に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏体質の有無について十分な問診を行うこと。

【合併症・既往歴等のある患者】

1. 薬物過敏症＜クロルヘキシジン製剤に対する過敏症を除く＞の既往歴のある者。
2. 喘息等のアレルギー疾患の既往歴、家族歴のある者。

【適用上の注意】

1. 薬剤使用前の注意：
 - 1) 血清・膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は十分に洗い落としてから使用すること。
 - 2) 石鹼類は本剤の殺菌作用を弱めるので、予備洗浄に用いた石鹼分を十分に洗い落としてから使用すること。
2. 薬剤使用時の注意：
 - 1) 手指消毒以外の目的には使用しないこと。
 - 2) 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。
 - 3) 眼に入らないように注意する（眼に入った場合は直ちによく水洗する）。
 - 4) 溶液の状態で長時間皮膚と接触させた場合に皮膚化学熱傷を起こしたとの報告があるので、注意すること。
 - 5) 反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
 - 6) 引火性があり、爆発の危険性もあるため、火気には十分注意すること。
3. 薬剤使用後の注意：本剤の付着した白布を次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系漂白剤で漂白すると、褐色のシミができることがあるので、漂白には過炭酸ナトリウム等の酸素系漂白剤が適当である。

【その他の注意】

1. 臨床使用に基づく情報：クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の使用によりショック症状を起こした患者のうち数例について、血清中にクロルヘキシジンに特異的なIgE抗体が検出されたとの報告がある。

【取扱い上の注意】

火気を避けて保存すること。

【保険給付上の注意】

本剤は保険給付の対象とならない（薬価基準未収載）。

【保管上の注意】

室温保存。



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.