商品名　ソフラチュール貼付剤10cm 添付文書情報

一般名	フラジオマイシン硫酸塩貼付剤	薬価	77.50
規格	（10.8mg）10cm×10cm 1枚	区分	
製造メーカー	テイカ製薬	販売メーカー	テイカ製薬
薬効	2．個々の器官系用医薬品 26．外皮用薬 263．化膿性疾患用剤 2634．外用抗生物質製剤		

ソフラチュール貼付剤10cmの用法・用量

本品の1～数枚を直接患部に当て、その上を無菌ガーゼで覆う。

ソフラチュール貼付剤10cmの効能・効果

外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染。

ソフラチュール貼付剤10cmの有効菌種

フラジオマイシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属（肺炎球菌を除く）。

ソフラチュール貼付剤10cmの副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

1．重大な副作用：

　1）腎障害、難聴（いずれも頻度不明）。

2．その他の副作用：過敏症：（頻度不明）発疹、接触皮膚炎。

ソフラチュール貼付剤10cmの使用上の注意

【禁忌】

ストレプトマイシン、カナマイシン、ゲンタマイシン、フラジオマイシン等のアミノグリコシド系抗生物質及びバシトラシンに対し過敏症の既往歴のある患者。

【重要な基本的注意】

1. 本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の使用にとどめること。
2. 感作されるおそれがあるので、観察を十分に行い感作されたことを示す兆候（そう痒、発赤、腫脹、丘疹、小水疱等）があらわれた場合には、使用を中止すること。
3. 広範囲熱傷、潰瘍のある皮膚には長期間連用しないこと。
4. 腎障害、難聴があらわれることがあるので、長期連用を避けること。

【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。

【取扱い上の注意】

夏季には涼しい場所に保管すること。

【保管上の注意】

室温保存。

薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量
Drug Intelligence Reinforce
医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.