

## 商品名 MS冷シップ「タカミツ」 添付文書情報

|        |                                                                          |        |                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| 一般名    | パップ剤（3-14）                                                               | 薬価     | 8.90                                            |
| 規格     | 10g                                                                      | 区分     |                                                 |
| 製造メーカー | <a href="#">タカミツ</a>                                                     | 販売メーカー | <a href="#">タカミツ</a><br><a href="#">三和化学研究所</a> |
| 薬効     | 2. 個々の器官系用医薬品<br>26. 外皮用薬<br>264. 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤<br>2649. その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 |        |                                                 |

### MS冷シップ「タカミツ」の組成・成分

膏体100g（700cm<sup>3</sup>）中

サリチル酸メチル：2.0g

dl-カンフル：0.5g

l-メントール：0.3g

### MS冷シップ「タカミツ」の用法・用量

1. 表面のプラスチック膜をはがして、患部に貼付する。
2. 1日1～2回使用する。

### MS冷シップ「タカミツ」の効能・効果

次記における鎮痛・消炎：捻挫、打撲、筋肉痛、関節痛、骨折痛。

### MS冷シップ「タカミツ」の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：過敏症：（頻度不明）発赤、発疹、腫脹。

## MS冷シップ「タカミツ」の使用上の注意

### 【禁忌】

1. 本剤に対して過敏症の既往歴のある患者。

### 【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。シクロオキシゲナーゼ阻害剤（経口剤、坐剤）を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。シクロオキシゲナーゼ阻害剤を妊娠中期以降の妊婦に使用し、胎児動脈管収縮が起きたとの報告がある。

### 【小児等】

- 1) 小児等を対象とした臨床試験は実施していない。
- 2) 乳幼児には刺激が強すぎることもある。

### 【適用上の注意】

1. 薬剤使用時の注意：

- 1) 使用部位：

- (1) 損傷皮膚及び粘膜には使用しないこと。
- (2) 湿疹又は発疹の部位には使用しないこと。
- (3) 眼又は眼の周囲には使用しないこと。

- 2) 使用時：

- (1) 汗をかいたり、皮膚がぬれている場合は患部を清潔にふいてから使用すること。
- (2) 本剤に触れた手で、眼、鼻腔、口唇等の粘膜に触れないよう注意すること。

### 【取扱い上の注意】

使用残りの薬剤は袋にもどし、口をしめ密閉して直射日光や高温の場所を避けて保存すること。

### 【保管上の注意】

室温保存。



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』