

商品名 エンペシド外用液1% 添付文書情報

一般名	クロトリマゾール液	薬価	13.60
規格	1% 1mL	区分	
製造メーカー	バイエル薬品	販売メーカー	バイエル薬品
薬効	2. 個々の器官系用医薬品 26. 外皮用薬 265. 寄生性皮膚疾患用剤 2655. イミダゾール系製剤		

エンペシド外用液1%の用法・用量

1日2～3回患部に塗布する。

エンペシド外用液1%の効能・効果

次記の皮膚真菌症の治療。

- [1] 白癬：足部白癬（足汗疱状白癬、趾間白癬）、頑癬、斑状小水疱性白癬。
- [2] カンジダ症：カンジダ症の指間糜爛症、カンジダ症の間擦疹、乳児寄生菌性紅斑、皮膚カンジダ症、カンジダ症の爪囲炎。
- [3] 癬風。

エンペシド外用液1%の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：皮膚：（0.1～5%未満）皮膚局所刺激感、（頻度不明）発赤・紅斑、皮膚炎、皮膚熱感。

エンペシド外用液1%の使用上の注意

【禁忌】

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者。

【妊婦】

妊婦＜3ヵ月以内＞又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。

【適用上の注意】


1. 薬剤投与時の注意：眼科用として角膜・結膜には使用しないこと。

【取扱い上の注意】

火気を避けて保存すること。

【保管上の注意】

室温保存。



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.