

商品名 アスタット軟膏1% 添付文書情報

一般名	ラノコナゾール軟膏	薬価	19.10
規格	1% 1g	区分	
製造メーカー	マルホ	販売メーカー	マルホ
薬効	2. 個々の器官系用医薬品 26. 外皮用薬 265. 寄生性皮膚疾患用剤 2655. イミダゾール系製剤		

アスタット軟膏1%の用法・用量

1日1回患部に塗布する。

アスタット軟膏1%の効能・効果

次記の皮膚真菌症の治療。

- 〔1〕 白癬：足白癬、体部白癬、股部白癬。
- 〔2〕 カンジダ症：カンジダ症の間擦疹、カンジダ症の指間びらん症、カンジダ症の爪囲炎。
- 〔3〕 癬風。

アスタット軟膏1%の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

- 2. その他の副作用：皮膚：（0.1～5%未満）皮膚炎（接触皮膚炎等）、皮膚刺激感、発赤、（0.1%未満）皮膚小水疱、皮膚そう痒感、皮膚亀裂、皮膚乾燥、皮膚腫脹。

アスタット軟膏1%の使用上の注意

【禁忌】

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者。

【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。

【適用上の注意】

1. 薬剤使用時の注意：

- 1) 著しいびらん面には使用しないこと。
- 2) 眼科用として角膜・結膜には使用しないこと。

【保管上の注意】

室温保存。



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.