

商品名 弗化ナトリウム液「ネオ」 添付文書情報

一般名	フッ化ナトリウム液	薬価	0.00
規格	2% 1mL	区分	
製造メーカー	ネオ製薬	販売メーカー	ネオ製薬 ナルコーム
薬効	2. 個々の器官系用医薬品 27. 歯科口腔用薬 279. その他の歯科口腔用薬 2790. その他の歯科口腔用薬		

弗化ナトリウム液「ネオ」の用法・用量

通常、歯面に対し2週間に3～4回塗布を1クールとし、これを年間1～2回次の方法により実施する。

〔塗布方法〕

1. 一般的方法：

（1）歯面の清掃

歯ブラシ等によって口腔内を十分に清掃してから、必要ある時は塗布面の歯石を除去し、ポリッシングブラシ又はポリッシングカップに研磨剤をつけて歯面から歯垢（苔）を除くようにする。

（2）防湿・乾燥

巻綿花（ロールワッテ）を用いて塗布する歯を孤立させ、綿球で唾液を拭った後、圧縮空気（エアーブロー）で乾燥する。

（3）薬液の塗布

薬液（2mL以下）に浸した脱脂綿、ガーゼ等で歯面をなるべく長く薬液に浸潤させる。塗布後約30分間は洗口させないで唾液を吐かせる程度にとどめる。

2. トレー法：

（1）歯面の清掃

一般的方法と同様に行う。

（2）トレーの選択及び適合

歯（列）弓に適合するトレーを選び、このトレーの大きさに合ったゴム袋及び塗布紙をセットする。

（3）薬液の浸潤

塗布紙にスポイトで薬液（2mL以下）を浸み込ませる。

（4）トレーの装着

トレーを口腔内に挿入し、軽く歯列に圧接して約4分間かませる。

（5）トレーの除去

トレーを外し、塗布紙を除去する。塗布後約30分間は洗口させないで唾液を吐かせる程度にとどめる。

【用法及び用量に関連する注意】

塗布薬液量は2mL以下とし、幼小児においては必要最小限度にとどめること。

弗化ナトリウム液「ネオ」の効能・効果

齲蝕の予防。

弗化ナトリウム液「ネオ」の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：過敏症：（頻度不明）過敏症状。

弗化ナトリウム液「ネオ」の使用上の注意

【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。

【授乳婦】

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

【過量投与】

1. 急性中毒：誤って飲用し、嘔吐、腹痛、下痢等の急性中毒症状を起こした場合には、牛乳、グルコン酸カルシウム等のカルシウム剤を応急的に服用させ、医師の診療を受けさせること。

【適用上の注意】

1. 薬剤使用時の注意：

- 1) 腐蝕性があるので、できるだけ口腔粘膜に薬液が触れないよう注意すること。
- 2) 塗布後約30分間は洗口させない（ただし、薬液の残留する唾液は吐き出させ、飲み込まないように指示する）。
- 3) 歯科医師又はその指導下で歯科衛生士が取り扱うこと。

【その他の注意】

2. 非臨床試験に基づく情報：

急性毒性（フッ化ナトリウム）

ラット 経口 LD50=180mg/kg。

【保管上の注意】

室温保存。



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.