

商品名 50mgアリナミンF糖衣錠 添付文書情報

一般名	フルスルチアミン錠	薬価	6.20
規格	50mg 1錠	区分	
製造メーカー	武田テバ薬品	販売メーカー	武田テバ薬品 武田薬品
薬効	3. 代謝性医薬品 31. ビタミン剤 312. ビタミンB 1 剤 3122. ビタミンB 1 誘導体制剤		

50mgアリナミンF糖衣錠の用法・用量

通常、成人には1日量1～2錠（フルスルチアミンとして50～100mg）を1日1～2回に分けて食後直ちに経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

50mgアリナミンF糖衣錠の効能・効果

- [1] ビタミンB1欠乏症の予防及び治療。
 - [2] ビタミンB1の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、甲状腺機能亢進症、妊娠婦、授乳婦、はげしい肉体労働時等）。
 - [3] ウェルニッケ脳症。
 - [4] 脚気衝心。
 - [5] 次記疾患のうちビタミンB1欠乏又はビタミンB1代謝障害が関与すると推定される場合：神経痛、筋肉痛、関節痛、末梢神経炎、末梢神経麻痺、心筋代謝障害、便秘等の胃腸運動機能障害、術後腸管麻痺。
5. の効能・効果に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。

50mgアリナミンF糖衣錠の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：

- [1] 過敏症：（頻度不明）発疹、そう痒感。
- [2] 消化器：（頻度不明）悪心、胸やけ、胃痛、胃部不快感、下痢、口内炎。

50mg アリナミンF糖衣錠の使用上の注意

【小児等】


小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

【適用上の注意】

1. 薬剤交付時の注意：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること（PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある）。

【保管上の注意】

室温保存。



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.