

商品名 アスコルビン酸注射液500mg「トーワ」 添付文書情報

一般名	アスコルビン酸注射液	薬価	100.00
規格	500mg 1管	区分	
製造メーカー	東和薬品	販売メーカー	東和薬品
薬効	3. 代謝性医薬品 31. ビタミン剤 314. ビタミンC剤 3140. ビタミンC剤		

アスコルビン酸注射液500mg「トーワ」の用法・用量

アスコルビン酸として、通常成人1日50～2000mgを1～数回に分けて静脈内注射する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

アスコルビン酸注射液500mg「トーワ」の効能・効果

- (1) ビタミンC欠乏症の予防及び治療（壊血病、メルレル・バロー病）。
 - (2) ビタミンCの需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦、はげしい肉体労働時など）。
 - (3) 次記疾患のうち、ビタミンC欠乏又はビタミンC代謝障害が関与すると推定される場合：毛細管出血（鼻出血、歯肉出血、血尿など）、薬物中毒、副腎皮質機能障害、骨折時の骨基質形成・骨折時の骨癒合促進、肝斑・雀卵斑・炎症後の色素沈着、光線過敏性皮膚炎。
3. の適応＜効能又は効果＞に対して、効果が無いのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。

アスコルビン酸注射液500mg「トーワ」の使用上の注意

【小児等】

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

【臨床検査結果に及ぼす影響】

1. 各種の尿糖検査で、尿糖の検出を妨害することがある。
2. 各種の尿検査（潜血、ビリルビン、亜硝酸塩）・便潜血反応検査で、偽陰性を呈することがある。

【適用上の注意】

1. 薬剤投与時の注意：

1) 投与経路：

(1) 経口投与が困難な場合や緊急の場合、また、経口投与で効果が不十分と考えられる場合にのみ使用すること。また、投与経路は静脈内注射を原則とすること。なお、経口投与が可能で効果が十分と判断された場合には、速やかに経口投与にきりかえること。

(2) 静脈内注射にのみ使用すること。

2) 静脈内注射時：血管痛があらわれることがあるので、注射速度はできるだけ遅くすること。

【保管上の注意】

冷所保存。



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.