

商品名 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日新」 添付文書情報

一般名	ヘパリン類似物質噴霧剤	薬価	9.70
規格	1g	区分	
製造メーカー	日新製薬	販売メーカー	日新製薬
薬効	3. 代謝性医薬品 33. 血液・体液用薬 333. 血液凝固阻止剤 3339. その他の血液凝固阻止剤		

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日新」の用法・用量

通常、1日1～数回適量を患部に噴霧する。

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日新」の効能・効果

血栓性静脈炎（痔核を含む）、血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患（注射後硬結並びに注射後疼痛）、凍瘡、肥厚性瘢痕・ケロイドの治療と予防、進行性指掌角皮症、皮脂欠乏症、外傷（打撲、捻挫、挫傷）後の腫脹・血腫・腱鞘炎・筋肉痛・関節炎、筋性斜頸＜乳児期＞。

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日新」の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：

- 〔1〕過敏症：（0.1～5%未満）皮膚炎、そう痒、発赤、発疹、潮紅等、（頻度不明）皮膚刺激感。
- 〔2〕皮膚（投与部位）：（頻度不明）紫斑。

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日新」の使用上の注意

【禁忌】

- 出血性血液疾患（血友病、血小板減少症、紫斑病等）の患者〔血液凝固抑制作用を有し、出血を助長するおそれがある〕。
- 僅少な出血でも重大な結果を来すことが予想される患者〔血液凝固抑制作用を有し、出血を助長するおそれがある〕。

【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。


【適用上の注意】

1. 薬剤使用時の注意：

- 1) 潰瘍・びらん面への直接噴霧を避けること。
- 2) 点鼻用として鼻腔内に使用しないこと。
- 3) 顔面、頭部等、吸入する可能性のある患部には注意して使用すること。

【保管上の注意】

室温保存。



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.