

## 商品名 ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） 添付文書情報

一般名	真武湯エキス顆粒（2）	薬価	13.10
規格	1g	区分	
製造メーカー	ツムラ	販売メーカー	ツムラ
薬効	5. 生薬及び漢方処方に基づく医薬品 52. 漢方製剤 520. 漢方製剤 5200. 漢方製剤		

### ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）の組成・成分

1日量7.5g中

- ブクリョウ：4
- シャクヤク：3
- ソウジュツ：3
- ショウキョウ：1.5
- ブシ末：0.5
- 以上のエキス：2.0g

### ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）の用法・用量

通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

### ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）の効能・効果

新陳代謝の沈衰しているものの次の諸症：胃腸疾患、胃腸虚弱症、慢性腸炎、消化不良、胃アトニー症、胃下垂症、ネフローゼ、腹膜炎、脳溢血、脊髄疾患による運動麻痺ならびに脊髄疾患による知覚麻痺、神経衰弱、高血圧症、心臓弁膜症、心不全で心悸亢進、半身不随、リウマチ、老人性そう痒症。

### ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：

- [1] 過敏症：（頻度不明）発疹、発赤、そう痒、蕁麻疹等。

[2] その他：（頻度不明）心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等。

## ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）の使用上の注意

### 【重要な基本的注意】

1. 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
2. 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意し、ブシを含む製剤との併用には、特に注意すること。

### 【合併症・既往歴等のある患者】

1. 体力の充実している患者：副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。
2. 暑がりでのぼせが強く赤ら顔の患者：心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等があらわれるおそれがある。

### 【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい（本剤に含まれるブシ末の副作用があらわれやすくなる）。

### 【授乳婦】

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

### 【小児等】

慎重に投与すること（本剤にはブシ末が含まれている）。

### 【高齢者】

減量するなど注意すること（一般に生理機能が低下している）。

### 【取扱い上の注意】

1. 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
2. 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。
3. 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

### 【保管上の注意】

室温保存。



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.