

## 商品名 コタロー八味丸料エキス細粒 添付文書情報

一般名	八味丸エキス細粒	薬価	6.70
規格	1g	区分	(劇)
製造メーカー	小太郎漢方製薬	販売メーカー	小太郎漢方製薬
薬効	5. 生薬及び漢方処方に基づく医薬品 52. 漢方製剤 520. 漢方製剤 5200. 漢方製剤		

### コタロー八味丸料エキス細粒の組成・成分

1日量9.0g中

ジオウ：5

サンシュユ：3

サンヤク：3

タクシャ：3

ブクリョウ：3

ポタンピ：3

ケイヒ：1

ブシ末2（炮附子末）：1

以上のエキス：5.3g

### コタロー八味丸料エキス細粒の用法・用量

通常、成人1日9.0gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

### コタロー八味丸料エキス細粒の効能・効果

疲労倦怠感がいちじるしく、四肢は冷えやすいのにかかわらず、時にはほてることもあり、腰痛があつて咽喉がかわき、排尿回数多く、尿量減少して残尿感がある場合と、逆に尿量が増大する場合があります。特に夜間多尿のもの：血糖増加による口渇、糖尿病、動脈硬化、慢性腎炎、ネフローゼ、萎縮腎、膀胱カタル、浮腫、陰萎、坐骨神経痛、産後脚気、更年期障害、老人性湿疹、低血圧。

## コタロー八味丸料エキス細粒の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 2. その他の副作用：

- [1] 過敏症：（頻度不明）発疹、発赤、そう痒等。
- [2] 肝臓：（頻度不明）肝機能異常（AST上昇、ALT上昇、T-Bil上昇等）。
- [3] 消化器：（頻度不明）食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、便秘等。
- [4] その他：（頻度不明）心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ等。

## コタロー八味丸料エキス細粒の使用上の注意

### 【重要な基本的注意】

1. 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
2. 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意し、ブシを含む製剤との併用には、特に注意すること。

### 【合併症・既往歴等のある患者】

1. 体力の充実している患者：副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。
2. 暑がりでのぼせが強く赤ら顔の患者：心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等があらわれることがある。
3. 著しく胃腸虚弱な患者：食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、便秘等があらわれることがある。
4. 食欲不振、悪心、嘔吐のある患者：これらの症状が悪化するおそれがある。

### 【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい（本剤に含まれるポタンピにより流産の危険性があり、またブシ末の副作用があらわれやすくなる）。

### 【授乳婦】

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

### 【小児等】

慎重に投与すること（本剤にはブシ末が含まれている）。

### 【高齢者】

減量するなど注意すること（一般に生理機能が低下している）。

### 【取扱い上の注意】

1. 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
2. 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。

3. 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

**【保管上の注意】**

室温保存。



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.