

商品名 テイコク六君子湯エキス顆粒 添付文書情報

一般名	六君子湯エキス顆粒	薬価	8.60
規格	1g	区分	
製造メーカー	帝國漢方製薬	販売メーカー	帝國漢方製薬 帝國製薬
薬効	5. 生薬及び漢方処方に基づく医薬品 52. 漢方製剤 520. 漢方製剤 5200. 漢方製剤		

テイコク六君子湯エキス顆粒の組成・成分

1日量7.5g中

- ニンジン：4
- ビャクジュツ：4
- ブクリョウ：4
- ハンゲ：4
- チンピ：2
- タイソウ：2
- カンゾウ：1
- ショウキョウ：0.5
- 以上のエキス：3.20g

テイコク六君子湯エキス顆粒の用法・用量

通常成人1日3回、1回2.5gを食前に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

テイコク六君子湯エキス顆粒の効能・効果

胃腸の弱いもので、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：胃炎、胃アトニー、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐。

テイコク六君子湯エキス顆粒の副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

1. 重大な副作用

- 1) 偽アルドステロン症：低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム貯留・体液貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症が現れることがあるので、観察（血清カリウム値の測定等）を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行う。
- 2) ミオパシー：低カリウム血症の結果としてミオパシーが現れることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・四肢麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行う。
- 3) 肝機能障害、黄疸：著しいAST上昇（著しいGOT上昇）、著しいALT上昇（著しいGPT上昇）、著しいAl-P上昇、著しいγ-GTP上昇等を伴う肝機能障害、黄疸が現れることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行う。

2. その他の副作用（頻度不明）

- 1) 過敏症：発疹、蕁麻疹等 [このような症状が現れた場合には投与を中止する]。
- 2) 消化器：悪心、腹部膨満感、下痢等。

テイコク六君子湯エキス顆粒の使用上の注意

【重要な基本的注意】

1. 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与する。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避ける。
2. 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意し、異常が認められた場合には投与を中止する。
3. 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意する。

【相互作用】

併用注意：カンゾウ含有製剤、グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤 [偽アルドステロン症が現れやすくなり、また、低カリウム血症の結果として、ミオパシーが現れやすくなる（グリチルリチン酸は、尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる）]。

【高齢者への投与】

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意する。

【妊婦・産婦・授乳婦等への投与】

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与する。

【小児等への投与】

小児等に対する安全性は確立していない [使用経験が少ない]。

【取扱い上の注意】

1. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保存する。
2. 吸湿性であるので、開封後は湿気に注意して保存する。

【保管上の注意】

気密容器。



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.