

商品名 ヨクイニンエキス散「コタロー」 添付文書情報

一般名	ヨクイニンエキス末	薬価	17.80
規格	1g	区分	
製造メーカー	小太郎漢方製薬	販売メーカー	小太郎漢方製薬
薬効	5. 生薬及び漢方処方に基づく医薬品 59. その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 590. その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 5900. その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品		

ヨクイニンエキス散「コタロー」の用法・用量

ヨクイニンエキスとして、通常成人1日1.0～2.0gを3回に分割経口投与する（ヨクイニンエキス散「コタロー」は、通常成人1日3.0～6.0gを3回に分割経口投与する）。なお、年齢、症状により適宜増減する。

ヨクイニンエキス散「コタロー」の効能・効果

青年性扁平疣贅、尋常性疣贅。

ヨクイニンエキス散「コタロー」の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：

- [1] 過敏症：（頻度不明）発疹、発赤、そう痒、蕁麻疹等。
- [2] 消化器：（頻度不明）胃部不快感、下痢等。

ヨクイニンエキス散「コタロー」の使用上の注意

【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

【授乳婦】

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

【小児等】

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

【高齢者】

減量するなど注意すること（一般に生理機能が低下している）。

【適用上の注意】

1. 薬剤交付時の注意：本剤をグラシン紙等の包材に分包して投薬する場合は、気密性の高い容器に入れ、湿度の低い場所（冷暗所）に保管すること。なお、冷所（例えば冷蔵庫など）に保管した場合、取り出し後にそのまま放置すると結露により吸湿して変色の原因となるので、速やかに保管場所に戻すよう投薬時に注意を行うこと。

【取扱い上の注意】

1. 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
2. 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。
3. 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

【保管上の注意】

室温保存。

