

商品名 メタコリマイシンカプセル300万単位 添付文書情報

一般名	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウムカプセル	薬価	51.90
規格	300万単位1カプセル	区分	
製造メーカー	サンファーマ	販売メーカー	サンファーマ
薬効	6. 病原生物に対する医薬品 61. 抗生物質製剤 612. 主としてグラム陰性菌に作用するもの 6125. コリスチン製剤		

メタコリマイシンカプセル300万単位の用法・用量

通常、成人にはコリスチンメタンスルホン酸ナトリウムとして1回300万～600万単位を1日3～4回経口投与する。小児には1日30万～40万単位/kgを3～4回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、小児用量は成人量を上限とする。

メタコリマイシンカプセル300万単位の効能・効果

感染性腸炎。

【効能又は効果に関連する注意】

「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照し、抗菌薬投与の必要性を判断した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与すること。

メタコリマイシンカプセル300万単位の有効菌種

コリスチンに感性の大腸菌、赤痢菌。

メタコリマイシンカプセル300万単位の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：

- [1] 過敏症：（頻度不明）発疹、そう痒感。
- [2] 消化器：（頻度不明）悪心・嘔吐、食欲不振、下痢。

メタコリマイシンカプセル300万単位の使用上の注意

【禁忌】

ポリミキシンB又はコリスチンに対する過敏症の既往歴のある患者。

【重要な基本的注意】

本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。

【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

【授乳婦】

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

【高齢者】

減量するなど注意すること（一般に生理機能が低下している）。

【相互作用】

2. 併用注意：

- [1] ポツリヌス毒素製剤〔過剰な筋弛緩があらわれる恐れがあり、閉瞼不全・頸部筋脱力・呼吸困難・嚥下障害等のリスクが高まるおそれがある（本剤およびポツリヌス毒素製剤はともに筋弛緩作用を有するため、作用が増強されるおそれがある）〕。
- [2] パロモマイシン硫酸塩〔腎障害があらわれることがあるので、腎障害があらわれた場合には、必要に応じ、投与中止等の適切な処置を行うこと（コリスチン（海外で注射剤において腎障害があらわれたとの報告がある）及びパロモマイシン硫酸塩は腎障害を悪化させる作用を有しており、併用によりそれらの作用が増強される可能性がある）〕。

【適用上の注意】

1. 薬剤交付時の注意：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること（PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある）。

【保管上の注意】

室温保存。



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.