

商品名 硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」 添付文書情報

一般名	ポリミキシンB硫酸塩錠	薬価	241.80
規格	100万単位1錠	区分	
製造メーカー	ファイザー	販売メーカー	ファイザー
薬効	6. 病原生物に対する医薬品 61. 抗生物質製剤 612. 主としてグラム陰性菌に作用するもの 6126. ポリミキシンB製剤		

硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」の用法・用量

ポリミキシンB硫酸塩として通常成人1日量300万単位を3回に分けて経口投与する。

硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」の効能・効果

白血病治療時の腸管内殺菌。

硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

2. その他の副作用：

- 〔1〕過敏症：（頻度不明）発疹、そう痒感。
- 〔2〕消化器：（頻度不明）悪心・嘔吐、食欲不振、下痢。

硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」の使用上の注意

【禁忌】

ポリミキシンB又はコリスチンに対し過敏症の既往歴のある患者。

【重要な基本的注意】

本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。

【腎機能障害患者】

1) 腸疾患を伴う腎障害又は腸管障害を伴う腎障害患者：腎障害の増悪又は神経系の障害を起こすおそれがある。

【妊婦】

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

【授乳婦】

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

【高齢者】


減量するなど注意すること（一般に腎機能が低下していることが多い）。

【適用上の注意】

1. 薬剤交付時の注意：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること（PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある）。

【保管上の注意】

室温保存。



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.