

商品名 臭化ナトリウム 医薬品基本情報

薬効	1126 ブロム塩製剤	一般名	臭化ナトリウム
英名	Sodium bromide Yamazen	剤型	末
薬価	83.50	規格	10g
メーカー	山善製薬	毒劇区分	

臭化ナトリウムの効能・効果

不安緊張状態の鎮静、小児の難治性てんかん

臭化ナトリウムの使用制限等

1. 類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、腎機能障害、脱水症、体液量の少ない、器質的脳障害、うつ病、緑内障、低塩性食事を摂取	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 肝障害又はその既往	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

臭化ナトリウムの副作用等

1. 過敏症、発疹、紅斑、そう痒感、悪心、嘔吐、食欲減退、下痢、頭痛、めまい、ふらつき、ざ瘡、膿痂疹	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
2. 興奮、運動失調、抑うつ、構音障害、意識障害	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満
3. 慢性中毒	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
4. 自殺念慮、自殺企図	記載場所	使用上の注意
	頻度	5%未満

臭化ナトリウムの相互作用

1.	薬剤名等	中枢神経抑制薬			
	発現事象	眠気・注意力低下・集中力低下・反射運動能力低下等が増強	投与条件	-	
	理由・原因	相互に中枢神経抑制作用を増強	指示	注意	
2.	薬剤名等	バルビツール酸誘導体			
	発現事象	眠気・注意力低下・集中力低下・反射運動能力低下等が増強	投与条件	-	
	理由・原因	相互に中枢神経抑制作用を増強	指示	注意	
3.	薬剤名等	アルコール			
	発現事象	眠気・注意力低下・集中力低下・反射運動能力低下等が増強	投与条件	-	
	理由・原因	相互に中枢神経抑制作用を増強	指示	注意	
4.	薬剤名等	飲酒			
	発現事象	眠気・注意力低下・集中力低下・反射運動能力低下等が増強	投与条件	-	
	理由・原因	相互に中枢神経抑制作用を増強	指示	注意	

臭化ナトリウムの配合変化

1.	薬剤名等	サリチル酸ナトリウムテオプロミン			
	発現事象	1週間以内に湿潤	投与条件	-	
	理由・原因	-	指示	注意	
2.	薬剤名等	次硝酸ビスマス			
	発現事象	1週間以内に湿潤	投与条件	-	
	理由・原因	-	指示	注意	
3.	薬剤名等	ジギタリス製剤			
	発現事象	1週間以内に湿潤	投与条件	-	
	理由・原因	-	指示	注意	
4.	薬剤名等	スルピリン			
	発現事象	1週間以内に湿潤	投与条件	-	
	理由・原因	-	指示	注意	
5.	薬剤名等	タンニン酸			

発現事象	1週間以内に湿潤	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

6. 薬剤名等：タンニン酸アルブミン等

発現事象	1週間以内に湿潤	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

7. 薬剤名等：安息香酸ナトリウム

発現事象	条件により湿潤	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

8. 薬剤名等：安息香酸ナトリウムカフェイン

発現事象	条件により湿潤	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

9. 薬剤名等：アンチピリン

発現事象	条件により湿潤	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

10. 薬剤名等：ホウ砂

発現事象	条件により湿潤	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

11. 薬剤名等：抱水クロラル

発現事象	条件により湿潤	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

12. 薬剤名等：リン酸アルカリ等

発現事象	条件により湿潤	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

13. 薬剤名等：硫酸銅

発現事象	変色	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

14. 薬剤名等：レゾルシン

発現事象	変色	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

15. 薬剤名等：タンニン酸

発現事象 沈殿生成

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.