

商品名 リンヴォック錠30mg 医薬品基本情報

薬効	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	一般名	ウパダンチニブ水和物徐放錠
英名	Rinvoq	剤型	徐放錠
薬価	6628.00	規格	30mg 1錠
メーカー	アッヴィ	毒劇区分	(劇)

リンヴォック錠30mgの効能・効果

アトピー性皮膚炎、中等症から重症の潰瘍性大腸炎の(維持療法、寛解導入)、中等症から重症の活動期クローン病の(維持療法、寛解導入)

リンヴォック錠30mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、敗血症、重篤な感染症、活動性結核、重度肝機能障害、好中球数が1000/mm ³ 未満、リンパ球数が500/mm ³ 未満、ヘモグロビン値が8g/dL未満、重度肝機能障害<Child-Pugh分類C>	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 強いCYP3A4阻害剤継続的投与中、アトピー性皮膚炎で高度腎機能障害、強いCYP3A4阻害剤と併用、潰瘍性大腸炎で高度腎機能障害、クローン病で高度腎機能障害	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意
3. 結核の既往、結核又はその恐れ・疑い、皮膚バリア機能が低下しているアトピー性皮膚炎、感染症<重篤な感染症を除く>又はその恐れ・疑い、胸部X線上結核治癒所見、肺外結核の既往、胸部画像検査で陈旧性結核又はその恐れ・疑い、結核既感染又はその恐れ・疑い、結核患者との濃厚接触歴、易感染性、静脈血栓塞栓症のリスクを有する、B型肝炎の既往、B型肝炎ウイルスキャリア、HBs抗原陰性かつHBc抗体陽性、HBs抗原陰性かつHBs抗体陽性、HBs抗原陽性、HBV DNA陽性、C型肝炎、HCV RNA陽性、HCV抗体陽性、腸管憩室、間質性肺炎の既往、好中球減少<好中球数1000/mm ³ 未満を除く>、リンパ球減少<リンパ球数500/mm ³ 未満を除く>、ヘモグロビン値減少<ヘモグロビン値8g/dL未満を除く>、腎機能障害、中等度肝機能障害、軽度肝機能障害、心血管系事象のリスク因子を有する関節リウマチ	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

リンヴォック錠30mgの副作用等

1. 間質性肺炎、発熱、咳嗽、呼吸困難、呼吸器症状	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明

2. 結核、重篤な感染症、日和見感染症、致死の経過、好中球数が1000/mm ³ 未満、リンパ球数が500/mm ³ 未満、ヘモグロビン値が8g/dL未満、重篤な過敏症、アナフィラキシー	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
3. 带状疱疹、肺炎、好中球減少、リンパ球減少、ヘモグロビン減少、ALT上昇、AST上昇、肝機能障害、静脈血栓塞栓症、肺塞栓症	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
4. 消化管穿孔	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満
5. 深部静脈血栓症、血管浮腫	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満
6. 悪心、腹痛、上腹部痛、咳嗽、上気道感染、急性副鼻腔炎、喉頭炎、ウイルス性喉頭炎、上咽頭炎、口腔咽頭痛、咽頭膿瘍、咽頭炎、レンサ球菌性咽頭炎、咽頭扁桃炎、気道感染、ウイルス性気道感染、鼻炎、鼻喉頭炎、副鼻腔炎、扁桃炎、細菌性扁桃炎、ウイルス性咽頭炎、ウイルス性上気道感染、気管支炎、ウイルス性気管支炎、細菌性気管支炎、気管気管支炎、単純ヘルペス、陰部ヘルペス、陰部単純ヘルペス、ヘルペス性皮膚炎、ヘルペス眼感染、鼻ヘルペス、眼部単純ヘルペス、ヘルペスウイルス感染、口腔ヘルペス、インフルエンザ、毛包炎、ざ瘡、嚢胞性ざ瘡、ざ瘡様皮膚炎、発疹、紅斑性皮疹、毛孔性皮疹、斑状皮疹、斑状丘疹状皮疹、丘疹性皮疹、そう痒性皮疹、膿疱性皮疹、頭痛、CK上昇、高コレステロール血症、血中コレステロール増加、高脂血症、脂質異常症、低比重リポ蛋白増加	記載場所	その他の副作用
7. 口腔カンジダ症、蕁麻疹、皮膚有棘細胞癌、基底細胞癌、皮膚乳頭腫、発熱、疲労、高トリグリセリド血症、体重増加	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
8. 結核	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
9. 好中球減少、リンパ球減少、ヘモグロビン減少	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
10. B型肝炎ウイルス再活性化	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
11. 皮膚有棘細胞癌、基底細胞癌、非黒色腫皮膚癌	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
12. 総コレステロール上昇、LDLコレステロール上昇、HDLコレステロール上昇、トリグリセリド上昇、脂質検査値異常	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

13. トランスアミナーゼ値上昇、トランスアミナーゼ値が基準値上限の3倍以上	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
14. 結核、肺炎、敗血症、ウイルス感染、重篤な感染症、重篤な感染症悪化、悪性腫瘍、真菌感染症、日和見感染症、致命的感染症、肺外結核、泌尿生殖器結核、リンパ節結核、活動性結核、感染症、感染症増悪、播種性带状疱疹、带状疱疹、ウイルス再活性化、ヘルペスウイルス再活性化、悪性リンパ腫、固形癌、皮膚感染症、重篤な皮膚感染症、消化管穿孔、催奇形性、非黒色腫皮膚癌を除く悪性腫瘍、主要な心血管系事象、Major Adverse Cardiovascular Events、MACE、悪性腫瘍＜非黒色腫皮膚癌を除く＞、心血管系事象、リンパ球数減少、赤血球数減少、毛包虫症、疥癬	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

リンヴォック錠30mgの相互作用

1. 薬剤名等：適応疾患の生物製剤	発現事象	感染症のリスクが増加	投与条件	-
	理由・原因	免疫抑制作用が増強、併用経験はない	指示	禁止
2. 薬剤名等：適応疾患の生物製剤	発現事象	感染症のリスクが増加	投与条件	-
	理由・原因	免疫抑制作用が増強、併用経験はない	指示	禁止
3. 薬剤名等：適応疾患の生物製剤	発現事象	感染症のリスクが増加	投与条件	-
	理由・原因	免疫抑制作用が増強、併用経験はない	指示	禁止
4. 薬剤名等：経口ヤヌスキナーゼ阻害剤	発現事象	感染症のリスクが増加	投与条件	-
	理由・原因	免疫抑制作用が増強、併用経験はない	指示	禁止
5. 薬剤名等：免疫抑制剤	発現事象	感染症のリスクが増加	投与条件	-
	理由・原因	免疫抑制作用が増強、併用経験はない	指示	禁止
6. 薬剤名等：生ワクチン	発現事象	感染症	投与条件	本剤開始直前及び投与中
	理由・原因	リスクを否定できない	指示	禁止
7. 薬剤名等：強いCYP3A4阻害剤継続的投与中				

発現事象	-	投与条件	アトピー性皮膚炎
理由・原因	-	指示	注意

8. 薬剤名等：強いCYP3A4阻害剤と併用

発現事象	-	投与条件	潰瘍性大腸炎
理由・原因	-	指示	注意

9. 薬剤名等：強いCYP3A4阻害剤と併用

発現事象	-	投与条件	クローン病
理由・原因	-	指示	注意

10. 薬剤名等：CYP3Aを強く阻害する薬剤

発現事象	本剤の血中濃度が上昇	投与条件	-
理由・原因	CYP3A阻害作用により本剤のクリアランスが低下	指示	注意

11. 薬剤名等：グレープフルーツ

発現事象	本剤の血中濃度が上昇	投与条件	-
理由・原因	CYP3A阻害作用により本剤のクリアランスが低下	指示	注意

12. 薬剤名等：CYP3Aを強く誘導する薬剤

発現事象	本剤の血中濃度が低下し効果減弱	投与条件	-
理由・原因	CYP3A誘導作用により本剤のクリアランスが増加	指示	注意

13. 薬剤名等：セイヨウオトギリソウ含有食品

発現事象	本剤の血中濃度が低下し効果減弱	投与条件	-
理由・原因	CYP3A誘導作用により本剤のクリアランスが増加	指示	注意

